MIPRO CLOSE UP 700

FÜR EINE OPTIMALE TRANSITPHASE

Für weitere Infos und zur online-Bestellung von Mipro Close Up 700 - QR-Code scannen!

A Futter | VLOG geprüft | pastus+ AMA-Gütesiegel tauglich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ansäuernder Schwefel und Ammoniumchlorid zur optimalen Vorbereitung des Ca-Stoffwechsel auf die kommende Laktation
- Methionin und Cholin zur Verbesserung des Leberstoffwechsels und der Immunfunktion
- Lebendhefe zur Verbesserung der Pansenfunktion
- Vollständige Vitamin- und Mineralstoffausstattung mit teilweise org. gebundenen Spurenelementen

ANWENDUNG

Mipro Close Up 700 während der letzten 3 Wochen der Trocken-stehzeit bis zur Abkalbung mit 700g je Tier und Tag in die tägliche Futterration einmischen.
Kontrollieren Sie regelmäßig die Futteraufnahme und den Harn-pH (Ziel: 6,2 - 6,8).

www.sano24.de

Sano Die Tier-Ernährer

MIPRO CLOSE UP 700

Sano Agrar Institut
Entwickelt! Erprobt! In der Praxis bewährt!

ERFAHRUNGEN AUS DER PRAXIS:

Die Wirkung von **Mipro Close Up 700** wurde auf zwei Praxisbetrieben mit 1400 bzw. 330 Kühen wissenschaftlich getestet. Der Versuch lief jeweils über einen Zeitraum von drei Monaten. Vorangegangene Transitphasen ohne **Mipro Close Up 700** dienten als Vergleichszeitraum. Im Versuchszeitraum erhielten die Trockensteher in den letzten 3 Wochen bis zum Abkalben eine angepasste Close up Futterration mit 700g **Mipro Close Up 700** pro Tier und Tag. Regelmäßiges Messen des Harn-pH- Wertes erfolgte zur Kontrolle des Fütterungserfolges.



Quelle: Praxistest Sano (2019 - 2020)

MANAGEMENTHINWEISE

- Achten Sie bei Ihren trockenstehenden Tieren unbedingt auf eine ausreichende Futteraufnahme. Diese sollte mindestens bei 12 kg Trockensubstanz pro Tier und Tag liegen.
- Kontrollieren Sie beim Einsatz von Mipro Close Up 700 7 bis 14 Tage vor errechnetem Abkalbedatum den pH-Wert des Harns zur Fütterungskontrolle. Dieser stellt sich bei korrekter Fütterung zwischen 6,2 und 6,8 ein.
- Bei Futterrationen mit einem DCAB-Wert >= 0 bewegt sich der Harn-pH zwischen 8,0 und 8,5.
- Die vorgelegte Futterration auch bei den trockenstehenden Kühen gut mischen um Selektion zu vermeiden.
- Trockenstehende Tiere sollten in der Vorbereitungsfütterung 21 Tage Zugang zur Ration mit Mipro Close Up 700 erhalten, um eine effektive Prävention von Stoffwechselerkrankungen zu erzielen. Stellen Sie dies durch regelmäßiges Umstallen der Tiere sicher.
- Der Einsatz von Mipro Close Up 700 setzt eine regelmäßige Analyse der Grundfuttermittel inklusive der Ausweisung der Kationen-Anionen-Bilanz voraus. Im Sano Labor erhalten Sie das Komplettpaket: Analyse der absoluten Nährstoffgehalte, Verdaulichkeit von Faser und Stärke und die Analyse der Mineralstoffgehalte zur Berechnung der Kationen-Anionen-Bilanz. Bestellen Sie Ihr Laborset bequem online unter: labor.sano.de.
- Zur optimal an die Bedürfnisse Ihrer trockenstehenden Kühe ausgerichteten Fütterung, kontaktieren Sie Ihren zuständigen Fachberater.

WAS VERSTEHT SICH UNTER SUBKLINISCHEM MILCHFIEBER UND SUBKLINISCHER KETOSE?

Subklinisches Milchfieber tritt 5- bis 10-mal häufiger auf, als dessen klinische Ausprägung. Dabei sinkt der Blut-Calcium-Spiegel unter 2 mmol/l Blut.
Der niedrige Blut-Calium-Spiegel beeinträchtigt vor allem Muskelzellen und Immunzellen in ihrer Funktionsfähigkeit. Das führt zu Folgeerkrankungen wie Mastitis, Ketose, Nachgeburtsverhaltungen oder auch Labmagenverlagerungen.

Von einer subklinischen Ketose spricht man bei einem Ketonkörpergehalt im Blut über 1,2 mmol/l. Sie erhöht das Risiko für Folgeerkrankungen und wirkt sich negativ auf die Milchleistung aus. Ein aussagekräftiger Zeitraum zur Messung des Ketonkörperspiegels ist der dritte bis fünfte Tag nach der Abkalbung.